




## CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC)

Información  
útil para  
pacientes



## ¿Qué es?

Un catéter central de inserción periférica (PICC, por sus siglas en inglés), también llamado “catéter PICC” es un tubo flexible, largo y muy delgado que por lo general se coloca en una de las venas grandes del brazo, por arriba o por debajo del codo. Este tubo se inserta hasta llegar a la vena ubicada sobre el lado derecho del corazón como lo muestra la figura siguiente.



## ¿Para qué se utiliza?

**El catéter PICC se utiliza para realizar extracciones sanguíneas, administrar medicamentos, líquidos o hemoderivados por vía intravenosa.**

Al ser un tubo pequeño y flexible, puede ser utilizado durante varias semanas y hasta meses, lo que significa menos punciones y por consecuencia menos dolor.

La manipulación del mismo siempre debe ser por personal entrenado (Enfermería) y técnica correspondiente.



## Luego de la colocación

Es posible que presente una mínima molestia en el sitio de inserción las primeras 24- 48 h, esto es normal, puede presentar un leve sangrado por lo cual **es importante la valoración y la curación según corresponda.**

## ¿Cómo debo cuidarlo?

- **No debe realizar fuerza excesiva** ni levantar cosas muy pesadas con el miembro donde se encuentra colocado el catéter.
- **Se recomienda no practicar deportes bruscos**, ya que el catéter puede desplazarse, salirse o dañarse.
- **No se permite nadar ni sumergirse.**
- Para evitar que el catéter se dañe, **no utilice alfileres, prensas puntiagudas o tijeras cerca de él.**
- **Al bañarse cubrir el catéter con un material impermeable** (film) para evitar que se mojen los vendajes que lo protegen. Deben permanecer secos y limpios.
- Siempre **adherir con cinta adhesiva el catéter a su brazo o usar una malla tubular** de sujeción para evitar que se enganche a otros objetos.
- **El parche oclusivo y el service del catéter PICC se debe realizar cada siete días**, en caso de no encontrarse internado. (Recuerde solicitar turno para el procedimiento en Hospital de Día en el segundo piso -Oncología)
- Es muy importante **prevenir las infecciones** (controle estos cambios en la zona de inserción, presencia de temperatura, color, dolor, secreciones o registro de fiebre, temperatura mayor o igual a 38C°)

**Ante dudas sobre su catéter PICC, comunicarse con nuestro servicio de Oncología y Hematología las 24 hs al (0351) 4688205**

Para más información seguinos en:

